



Подготовка для проведения колоноскопии препаратом ФОРТРАНС

За 3 дня до исследования исключить из пищи клетчатку (фрукты, овощи, ягоды, орехи). Исключить из приема активированный уголь.

За 2 дня до исследования вечером принять слабительное независимо от характера стула - Дюфалак 60 мл (или Касторовое масло 60 мл), а на ночь Эспумизан (5 капсул).

За 1 день до исследования - не кушать, пить можно без ограничений. Вместо обеда можно принимать любые жидкости (сок, бульон, компот и пр.), можно кушать желе и пить кисель без ягод, леденцы в любом количестве для снятия чувства голода, сахар, мед.

ФОРТРАНС (4 пакета): каждый пакет развести на 1 литр воды. Вода комнатной температуры, кипяченая или минеральная, но без газов. Накануне исследования принять 2 литра с 18 часов до 20 часов (1 литр в час). Пить стаканами «залпом» с интервалом 15 минут. Раствор можно пить охлажденным, запивать лимонным соком. На ночь принять Эспумизан (5 капсул).

В день исследования принять оставшиеся 2 литра Фортранса. Окончить прием последней дозы препарата следует не позднее чем за 3 часа до времени начала исследования. С последним стаканом жидкости принять Эспумизан (5 капсул).

По время приема Фортранса рекомендуется ходить, легкие круговые движения корпусом, легкий массаж передней брюшной стенки.

ВАЖНО: Для выполнения процедуры под седацией (**наркозом**) ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ результаты следующих анализов не старше 1 месяца:

- ЭКГ
- общий анализ крови
- сахар крови (глюкоза)

Врач в праве отказать в проведении процедуры под наркозом пациенту без результатов анализов, либо с просроченными результатами. Просьба отнестись с пониманием, от этого зависит Ваша жизнь и здоровье.

Если Вы принимаете кроворазжижающие препараты, необходимо прекратить прием за 1 неделю до процедуры.

Крайне не рекомендуется управлять автомобилем, другими механизмами, а также принимать важные решения в течение суток после седации.

***Удаление полипов и взятие материала на биопсию оплачивается отдельно!**

Подготовка для проведения колоноскопии препаратом ЭЗИКЛЕН

За 3 дня до исследования исключить из пищи клетчатку (фрукты и овощи, орехи). **За 2 дня до исследования** после ужина принять слабительное средство независимо от характера стула на выбор: Дюфалак 60 мл (запрещен при сахарном диабете) или Касторовое масло 60 мл (2 флакона, принимать в теплом виде, запрещено при желчекаменной болезни). На ночь выпить Эспумизан (5 капсул)

В день приема Эзиклена (**за 1 день до колоноскопии**) — не принимать пищу, разрешено употреблять только прозрачные жидкости (бульоны, компоты, соки без мякоти, чай, кофе, вода) без ограничений, также можно кушать желе и пить кисель без ягод, леденцы в любом количестве для снятия чувства голода, сахар, мед. **День перед процедурой:** Вечером накануне процедуры (например, в 18.00) необходимо следовать следующим инструкциям:

Содержимое одного флакона препарата Эзиклен® следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л).

В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л). **День процедуры:**

Утром в день процедуры (через 10-12 ч после вечернего приема препарата) необходимо повторить действия, согласно инструкциям для вечера накануне:

Содержимое второго флакона препарата Эзиклен® следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л).

В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л).

Прием полного объема разведенного раствора препарата Эзиклен® и дополнительного количества воды или прозрачной жидкости должен быть закончен как минимум за 2 часа и не позднее 4 часов до начала процедуры.

Весь вечер накануне исследования и утром больше ходить, двигаться для лучшего опорожнения кишечника.

ВАЖНО: Для выполнения процедуры под седацией (**наркозом**) ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ результаты следующих анализов не старше 1 месяца:

- ЭКГ

- общий анализ крови

- сахар крови (глюкоза)

Врач в праве отказать в проведении процедуры под наркозом пациенту без результатов анализов, либо с просроченными результатами. Просьба отнестись с пониманием, от этого зависит Ваша жизнь и здоровье.

Если Вы принимаете кроворазжижающие препараты, необходимо прекратить прием за 1 неделю до процедуры.

Крайне не рекомендуется управлять автомобилем, другими механизмами, а также принимать важные решения в течение суток после седации.

Если у Вас возникнут вопросы относительно подготовки к процедуре - свяжитесь с нами - мы обязательно поможем!

С уважением, коллектив Клиники «ПЛАТАН»